

---

TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

T Y P H O

---



---

TENTAMEN MEDICUM

IN AUCURATE

DE

T Y B H O

---



13  
TENTAMEN MEDICUM  
INAUGURALE,

DE

TYPHO;

QUOD,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praeecti;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,  
Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS  
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

THOMAS WOOD,

HIBERNUS,

Soc. Med. Hibern. Edinb. olim Soc. Extraord.

et Praefes annuus;

necnon

Soc. Philosophico Literar. Soc. et Praefes annuus.

*Nen mihi sed rationi, aut quae ratio esse videtur, milito;  
securus quid mordicus hic tenet, aut hic.* SCALIGER.

Ad diem 24. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

---

M,DCC,XCV.



O blessed health! thou art above all gold and treasure;  
'tis thou who enlargest the soul,—and openest all it's powers  
to receive instruction and to relish virtue. He that has  
thee, has little more to wish for; and he that is so wretch-  
ed as to want thee,—wants every thing with thee.

TRISTRAM SHANDY.



Patruo suo dilectissimo,  
Reverendo viro  
JOANNI RUSSEL CAREW,  
Apud Garrane,  
In praefectura Corcagiensi ;  
Itemque  
Reverendo viro  
GEORGIO ARMSTRONG,  
Praeceptoris suo eximio et amico,  
Ad Corcagiam ;  
S. P. D.

THOMAS WOOD.

*Propter instituta perennia, jubente senatu amplissimo, quae in hac alma academia, thesin inauguralem, ex singulis pro gradu doctoris candidatis, in lucem proferendam exigunt, non est cur ex ipso non loetor animo, occasionem esse oblatam, qua beneficia agnoscam, quantumque vobis sum devinctus palam profitear. Exiguum equidem est pignus, attamen sincerum, et animum haud ingratum esse nec immemorem ostendere saltem inserviat Affini ob amorem patruissimum, tum et beneficia amicissima ;—praeceptoris propter monita praeceptaque utilissima quibus me dignatus est, obstrictus sum. Accipiatis igitur, benevolis animis, haec qualiacunque sint studiorum meorum tyrocinia, quae vestris nominibus, viri reverendi, libens lubensque inscribo.*

DABAM EDINBURGI, IDIBUS

JUNII, S. H. 1795.



Printed and Published by

Richard D. Wood

JOHANNI RUSSELL CARNE

Apud Curiam

In praesentibus Curia;

habeat

Et modo

GEORGIO ARMSTRONG

Ex parte suo et aliorum

Ad Executionem

et c.

THOMAS WOOD

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

TYPHO.

---

---

Auct. T. WOOD.

---

---

PROŒMIUM.

**M**ORBORUM quibus humanum genus fit obnoxium, nullus forsan insultu tam improvise et celeri, exitio tam infausto ac febris *continua* olim aggressus est. Non est igitur cur miremur, homines quidem multos ab eo correptos praemortuosque fuisse apud antiquos; praesertim in aevis, quibus natura et curatio morborum fere omnium parum intellectae fuerunt. Licet res ita sese habuerit, tamen fatendum est, hoc prae-



fens aevum illis feculis divinctum esse, quippe quod illa, nobis viam per ignorantiam suam aperuerunt, potius experientiam sequendi quam fidem theoriae dubiae habendi. Doctrina nostra hodierna, quae maximi momenti est, haud ex variis hypothesibus pro causa proxima excusis, sed ex ratiocinatione plus aequa experientiâ comprobata, ortum deduxit. Opiniones veterum e contra, intuitum operum naturae levissimum, et iudicium symptomatibus minoris momenti implicatum, planè coarguunt; quod manifestè ex sententiis eorum probandum sit de

*Causa proxima.*—Opiniones antiquiorum attamen, quae nunc minime valent, in lucem proferre supervacaneum duco. De recentioribus igitur, quibus faverunt SYDENHAM, BOERHAAVE, HOFFMAN, et CULLEN sermo tantum erit.

Vir illustris primus causam proximam materiei febricali attribuit; verum actionem ejus in corpore,



pore, se non posse exequi palam confessus est.

Ille de hac re differens, hisce loquitur verbis.

“ *Si mentem serio applicuerimus, quid de facto agat*

“ *natura et quibus in operatione sua utatur orga-*

“ *nis, deprehendere valemus; modus tamen quo*

“ *illa operatur, aut ego fallor, semper latebit \*.*”

Quamvis sententia ejus perquam ingeniosa vide-

tur, futilitatem tamen perspicuè ostendit Profes-

sor noster eruditissimus DUNCAN †. Ratiocina-

tio sua hujusmodi est :—opinionem à SYDENHAM

complexam et à variola extortam, analogiâ neuti-

quam stabilitam affirmat : quia nempe variolae,

rubeolae, pertussi, &c. semel tantum per vitae

decursum obnoxii sumus : quinetiam, licet hi

morbi, cum bene tractantur, mites eveniunt, ta-

men cursus eorum solitus excurrendus est ; dum

febris e contrario, ope remedii vomitorii vel scin-

tillarum electricarum extemplo saepe in fugam

vertitur. Praeterea, jam luculenter patet, eam

esse

\* SYDENH. *Dissertat. Epist.* Pag. 485. 6.

† *Praelect. Clinic.*



esse natam sine contagio pro causa.—De *lentore fluidorum*, cui credidit BOERHAAVE, motum sanguinis accelerante, imprimis notat, pulsus arteriarum ex aliis causis accelerari posse; dein, ad hypothesein suam firmandam, nonne inferre debet, renixum corporis superficiei accidisse? Pulsus tamen, etiam cum sudore profuso, saepe crebri sunt.—Huc quoque addendum venit, quod lentoris formatio tarda fit, dum actutum agit contagio.—*Spasmm cum debilitate* quod attinet, opinionem quam stabilire conati sunt HOFFMAN et CULLEN medici magni nominis, idem animadvertit, utrosque nonnunquam adesse sine febris instante vel succedente, quod frequenter accidit post lavationem frigidam. Praeterquam cur atonia spasmm gignit, intellectu difficile est; namque saepenumero adest magna debilitas absque eo; e contra sudor aliquando colliquativus in conspectum prodit.

Professor noster ex experientia edoctus, hanc  
causam



causam in statu cerebri morbido ponit; et omnibus medicis, his attentione debita perpensis, jam probe persuasum est quod haec notitia plus consona, magisque cum experientia et morbi natura consentanea, quam omnes supra recensitae. Verum enimvero multum abest ut hic status cerebri ex toto intelligatur, et quod multum probandum adhuc restat, modicè affirmat.

*Morbi Character.*—“ *Morbus contagiosus, calor*  
 “ *parum auctus, pulsus parvus, debilis plerumque*  
 “ *frequens; urina parum mutata; sensorii functi-*  
 “ *ones plurimum turbatae, viresque multum immi-*  
 “ *nutae \*.*”

*Historia.*—Phaenomena quae huic morbo praecedunt, aequae ac mutationes causis occasionalibus inductae, priusquam symptomata quod primo

mo

\* CULLEN *Synops. Nosolog. Methodic.* Tom. II. Gen. V.



mo manifestè apparet, sub tenebris omnia latent, propter systematis nervosi ignorantiam. Ad primum morbi insultum, gradus quivis debilitatis universalis adest, quem sequuntur anorexia, languor, lassitudo. Sic aeger sese habet pro die una vel altera, cum frigus calorque sibi invicem succedunt, torpore vultuque dejecto, vertigine, nausea, plerumque vomendi desiderio comitata. Vultus pallefcit, decrefcit. Ægre vel leviter dormit; et occurrunt somnia horrifca. Haec symptomata manè quodammodo allevantur; vesperi autem semper ingravescunt. Pulsus arteriarum, uti docet definitio, parvi sunt et debiles, plerumque crebri et inaequales. Inaequalitas in hoc constat, quod pulsationes quaedam, crebrae et validae observantur cum subito sanguinis fluxu vultum, genas praecipue, rubore suffudentis; nonnunquam fluctuantes fieri solent, illico post placidae aequalesque, et sic vicissim\*. Calor faciei interdum quasi ardens percipitur;

\* HUXAM *on the Slow Nervous Fever*, chap. 7.



cipitur; colorque ad diem sextum septimumve ex morbo inchoato, et juxta finem infaustum, admodum ruber. Membra inferiora, eodem tempore, perfrigida sentiuntur. Oculi auresque modo inusitato afficiuntur: hi vero ex morbi initio languescunt, hebescunt. Lingua siti inexplebili affecta, mucro albedo semper fere oblita est; et cutis plerumque arida et sicca videtur. Lotium modo rubet, modo et quidem frequentius pallet; aliquando sincerum nec ullâ nubeculâ suffuscatum; nonnunquam attamen cerevisiam tenuem et vapidam cum sedimento levi refert. Alvus tarda vel soluta est; rarissime sed interdum naturalis. Ad diem plus minus septimum, signa omnia ingravescunt. Respiratio gravior fit, et sudores frigidi in frontem erumpunt. Asperi sentiuntur per caput dorsumque dolores. Delirio quoque, necnon tinnitu aurium subsultuque tendinum affligitur aeger. Dum perstat delirium, perturbatur animo, magnopere mutit balbutitque. Marginem luteosum habet  
lingua,



lingua, et nisi mollis humidaque fervetur, variis dehiscit partibus. Dentes materia subnigra operiuntur, et per totum os insuavis sentitur sapor, qui saepe vomitum nauseamque deducit. Aliquando immensi subito erumpunt sudores, plerumque frigidi, et extremitates versus viscidi: aliquando etiam sudor, morbo invadente, manans, is ad finem usque perstat. Petechiae per totum corpus passim se diffundunt, praesertim in pectus dorsumque; quod tamen non semper accidit, neque si quando fit, fixum excipit morbi terminum. In quibusdam exemplis observantur a quarto die, in aliis vero, non ante decimum quartum. Morbo jam ad lethalem vergente exitum, omnia debilitatis signa graviora fiunt. Vox demissa, tenuis, et vix audienda evenit. Pro delirio, profundus aggreditur sopor, et aeger, viribus deficientibus, summum lecti locum tenere impotens, imas versus partes gradatim delabitur. Partes corporis inferiores, sanguine propius cor accedente, frigeant. Ungues pallidae  
feu



feu lividae fiunt; ictus arteriarum debiliores, crebriores; interdum verò tardiores et nonnunquam etiam intermittentes. Nunc saepius remeant tendinum subsultus. Floccos capere quos in aëre natantes percipere credit, fimbriasque vestis sejungere aggreditur aeger. Hebes et fere sine sensu evadit; vix clarissima voce seu fulgentissima luce afficitur, quamvis ad eas suscipiendas, morbo ingruente, facillimus esset. Singultus insequitur vehemens totumque corpus cadaverosum fit. Quae partes jacenti premuntur, eae gangraena afficiuntur. Sphincteres relaxantur; hinc lotium et faeces et lachrymae inscitè excernuntur: sanguis etiam e naribus et gingivis interdum defluit. Omnia haec signa dissolutionem corporis appropinquantem planè indicant. Haec inter, tendinibus vellicantibus tremantibusque convulsionem universalem praemonstrantibus, vita denique extinguitur.



Tempus speciale quo haec febris vitae terminum ponit, incertum est. Illust. PRINGLE affirmat, eventum ejus se vidisse, et per mortem et per salutem in septimum diem ; frequentius vero eam obtinere ad decimum quartum aut vicèsimum, immo equidem ad diem vicesimum octavum. Non desunt etiam exempla ubi morbus adhuc diutius perstitit : namque in nosocomio regio hujus urbis, puer hoc morbo laborans, per temporis spatium multo longius aegrotabat, quam auctor supra memoratus experiendo unquam compertus est. In tumores glandularum qui suppurant, interdum desinit hic morbus. Post exitum interdum occurrunt surditas et quaedam fatuitas, uti nonnulli autumant. Nobis autem verisimilius videtur, has affectiones per morbi decursum enatas, finem ejus excipere.

*Diagnos.*—Cum attentè consideremus nexum inter febres, argumentum inire de quo illae discrepant, supervacaneum esse judicamus. *Synocham*



*cham* vero quod attinet, docemur eam perraro, si unquam quidem sinceram sese ostendere. Verisimilius nobis videtur auctores parum accuratos fuisse; et loco *synochae*, synochum seu febrim, forsan cum typo locali falsè depinxisse.

A. cel. GREGORY certiores facti sumus, se ne singulum quidem synocha correptum unquam vidisse, quamvis complures febre laborantes ipse tractaverat. Huc accedat, hoc medico eximio testante, quendam, ex usu immodico liquorum spirituosorum qui vapores calidos ex alembico sursum emittebant, signis hujus febris nonnullis corripitur: at insuper dicit, morbum potius maniam quam synocham retulisse. Quinetiam ab simile non est, synochum antiquis tractatum, in finem infaustum ob regimen calidum se brevi deduxisse, sine comate aliisque debilitatis signis quae typho apparent. Si hanc febrim ita tractatam e typho discrepare velis; discrimen tamen



tum methodo curandi; namque si ei typhus debilis typhoides superveniret, delirio et signis inflammatoriis mitigatis, morbus in typhum se deflexerit.

*Causae quae corpus typho opportunum reddunt.*

*Calor.*—Caloris virtus *modici* omnibus diu bene nota est. Ut stimulus pro vita conservanda tam gravis momenti est, ut omnia sine ejus impulsu, et animalia et vegetabilia, brevi pereant. *Immodicus* corpus enervat, omnes secretiones excretionisque perturbat, et tonum ventriculi laedendo, eum praevent subsidio quod toti corpori exigitur. Cum ardens sit calor, particulas primarias distendit et a se invicem, vi ejus expansiva, sejungit: sic vires quibus cohaerent, consumit. Quod ad morbos pertinet, dicere non fit inutile. In typho nunquam sudorem percepi, cum pulsus fuissent crebri atque debiles, calore,  
eodem



codem tempore, inordinato existente; nec quidem in aliis morbis acutis, ubi pulsus duri et crebri et pleni inveniuntur.

*Frigus.*—Corpus frigori oblatum, calorem emittit fortasse cum infra gradum  $62^{\circ}$ , pro rato gradu adhibito. Quum mediocre, corpus roborat; sed quum maximè intensum, vitam extinguit, quia corpus uti supra diximus, absque quodam caloris gradu qui ad evolandum in statu ejusmodi proclivis est, nequit existere. Quoniam sententiae promulgantur variae de ejus natura, haud alienum igitur foret, opiniones proponere paucas, quae stabiliendae forsan adhuc restant.

Utpote frigus quam maxime licet intensum sine quodam caloris gradu praefactum adhuc nusquam fuit, nobis concludere fas sit, frigus vim sedativam absolute non esse: namque ubi calor si etiam minimus existat, ibi verisimile sit



vita hujus aliufve modi\*. Verum enim vero corpus humanum quod attinet, quo gradus caloris quidam exigitur ut ritè faciliufque munera ejus folita abfolvenda, fine dubio videtur, quod gradus qualifcunque fit .62° infra, apte et jure appellatur quoad corpus humanum *frigus fedativum*, cujus effectus plerique et tactu sentiunt et oculis vident; fcilicet, cute corrugata, facie pallida, et in quibusdam hominibus habitu molli flaccidoque gaudentibus, propter curfum fluidorum intus verfum, cephalalgia vel fenfu aliarum partium corporis ingrato. Frigus cohaefionem inter fibras arteriae calore nimis diftenta inducit, quò impetus fanguinis imminuitur. Hoc in modo, noftro faltem judicio, cohaefio fit perfecta: arteria fcilicet fluidis diftenta, calorem fuum fpontè tradit, et fic tonum fibrarum folitum recuperat vas. Ab hoc exemplo multifque aliis,

\* Illuftrari id queat pifcibus, qui polo arctico hiemant, multifque animalibus, immo infectis, qui, frigori intento, hifce in regionibus atris fuperftites funt.



aliis, manifestè patet vis sedativa frigoris; quia enim si esset stimulus, vim arteriae expansivam augetet.

Vires aëris frigidi in corpus, et praesertim in pulmones indeque in omnia iis pendentia organa, namque “auxilio spirabilis aerae indigent,” experimento in canem instituto aptè probeque commonstravit ingeniosus anatomicus, CRUIKSHANK. “*I opened the wind pipe of a dog whose spinal marrow had been divided in the neck, in whom the par vagum and intercostal nerves had also been divided in the neck. He had been apparently dead above a minute, and the heart had ceased pulsating. I introduced a large blow-pipe into the opening made in the wind pipe, and began inflating the lungs. I imitated the slow and full respiration. In about half a minute, the heart began to pulsate again: I continued my inflation of the lungs, and the heart continued to beat full equable pulsations,*”

“ *sations, at the rate of 70 in a minute, for a com-*  
 “ *pleat half hour. Hence it is evident that the*  
 “ *heart's action was reproduced and kept up from*  
 “ *the stimulus of the air on the lungs, and in con-*  
 “ *sequence of keeping up their motion \*.*”

De frigore cum humiditate conjuncto, ebrietate, pathematis animi, exinanitionibus insolitis, metu, vita sedentaria, &c. supervacuum est verbum amplius dicere, quam omnes corpus directè aut indirectè infirmando agunt. Sed vero quoniam debilitas ex omnibus ut causa praedisponens non conceditur, haud abs re esset observationes paucas proferre. Observatum est, si debilitas ad febrem praedisposuerit, senes, phthificos, hydropicos contagio febris obnoxiores fore quam eos minus enervatos : Quod res ita se habet, liquido patet ex experientia Prof. GREGORY qui nunquam nisi unum hydrope laborantem,

\* CRUIKSHANK'S *Letter to Mr CLARE.*



tem, contagio febris affectum vidit. E contrario dicitur, corpus humanum binis morbis, eodem tempore, raro condolere: sunt qui affirmant, hoc nunquam accidisse; attamen id interdum evenire, persuasum est hoc eximio viro\*.

Atqui

\* Constat nihilominus fortasse, corpus uno eodemque tempore à duobus morbis contagiosis nunquam affici: factum à CRUIKSHANK est narratum, quod suis verbis tradere liquet. “ The presence of one infectious matter will sometimes prevent the absorption of another. A very curious instance of this I had last summer in a child I had inoculated at Parson’s Green. On the eighth day after I had inoculated her, the measles appeared, and no change had taken place in the arm where the variolous matter had been inserted. It appeared quite well, nor could I discover where the puncture had been made. The measles lasted their usual period, about fourteen days, and on the beginning of the fourth week after she had been inoculated, the puncture in the arm began to inflame, formed a fair small-pox pustule, and the usual eruption followed. The child had them of a very mild kind, though she had been very ill of the measles, and recovered. A similar

Atqui re ita se habente, corpus adeo enervatum morbo qui inveteraverit et systema nervosum adeo mutatur, quod contagium typhi nisi admodum acre vel grandi copia accumulatum, corpus nequit afficere, propter vim vitae valde exinanitam et sentiendi fere impotentem. Contagium igitur ex hujus defectu, et irritabilitatis et forsan caloris, ad actionem ejus fovendam et incitandam spectantium, necesse est ut pereat. Verum cum contagio magna vi accumulata, et naturâ magis aspera fit, oportet in corpore saevire pariter ac contagium pestis. Hinc febris forsan insultum facit in hydropicos. Intellectu haud difficile est, quod nequit paucillulum et modicum, magnum multumque plerumque queat. Haec opinio plus consona videtur ex observatione sequente. Juvenes et vigentes praesertim, cum corpora eorum

ullo

case formerly occurred to Mr Hunter. He mentioned it to me as a proof, that two infectious diseases could not act upon the body at the same time. CRUIKSHANK'S letter to Mr Clare."



ullo modo enervata sint, contagio febris potissimum affliguntur: in hos faevit etiam majore impetu. Contagio in talibus corporibus recepta, irritabilitatem eorum incitat quae multo plus eandem exaequat quam in statu languido, tabescente quo debilitas fere immutabilis evenit.

*Causae occasionales.*—Causae ad typhum gignendum recensitae, sub capita duo plerumque veniunt; quorum,

1<sup>um</sup>, Agnoscit contagionem e corporibus febricitantium exorientem.

2<sup>um</sup>, Habet causas quae modo peculiari debilitant: hujusmodi sunt aër inquinatus e qualicumque re; defatigatio cum humiditate, venus immodicè culta, pathemata animi, exinanitiones insolitae, &c. &c.

De contagione typhoidea observationes inire

supervacuum

supervacuum est.—De *aëre inquinato* permultae sunt affirmationes antiquorum quae causam febris quam maxime malignae id ascribunt. De caeteris verum causis ad typhum gignendum respicientibus, probabilitas nobis tantum restat; namque experientia ex toto deficit. Veruntamen quoniam huic morbo origo ascribenda est e contagione humana minime pendens, veresimile videtur hunc ab iisdem causis etiamnum enasci posse; et de his, nullae probabilius existunt quam conjunctio illorum quae supra recensuimus. Anno 1731 in dissertatione medici eruditi apud Corcagiam, multae notantur causae; quales aër irriguus, aqua immunda, nidor lanienarum rancidarum foetidus, simul cum grandi copia carniū sine vegetabilibus, tempestate cibaria durante, pauperibus devorata\*.

Non defunt etiam qui huncce morbum miasmatis paludum attribuunt. Pestem seu aliquem morbum

\* ROGERS'S *Essay on Epidemic Diseases.*



morbum exitiosum, pro annis decem saevientem, aquae foetidae, lutulentae ad oppidum *Delft* referunt quidam. Haec res ab illust: LIND, de morbis Indiarum occidentalium narrante, firmatur;—observat, littora paludosa esse, quibus si quis accederet, statim nausea vomituque aggrediretur et illico post febris typhoidea. Quomodo-  
cunque haec res sese haberet, certum est quod inter typhum et intermittentes connexio valet. *Pringle*, de febribus intermittentibus provinciarum foederatarum, dicens, minime dubitat quin res ita sit\*.

Est et alius vir cui, nobis persuasum est, asserenti magis prae caeteris observantia habenda est, qui affinitatem has inter febres ultra metam in hisce verbis ponit. “ *Quartans and Tertians*  
“ *are apt to become Quotidians, these to pass into*  
“ *the*

\* PRINGLE, Part I. Chap. I.

“ *the state of Remittents, and these last to become con-*  
 “ *tinued \*.*”

Pro certo habetur quoque cæl. DUNCAN typhum penultima aestate tractavisse, quae in febrim intermittentem planè se deduxerat.—Connectio inter febres haud difficilis intellectu e quo chemia, testibus CRELL et HASSENFRAZ, in lucem protulit ; scilicet, acidum tartarosum ex carbono et hydrogeno, primâ oxygenatione, fieri ; secundâ et tertiâ, acidum oxalicum et acidum acetosum vel aceticum. Ex omnibus his factis nobis equidem omnino incongruum videtur, contagium, sive actio ei sit chymicâ quae Doctõribus BEDDOES et WOOD placuit, sive incitans vel seditiva, effectus suos gignere secundum naturam systematis vimque suam concentricam. Hoc tamen propositum fines quidam quodammodo terminant ; quippe enim aliquid contagio est proprium, quod plerumque se disponit ut eundem morbum produceret.

*Prognosis.*

\* CULLEN'S *First Lines*. Parag. 57. Vol. I.



*Prognosis.*—Non est ex uno vel altero symptomate eventum hujus morbi dirimi posse ; namque ad eum stabiliendum multa conspirant. Inter signa infausta videtur esse nexus quo, simili fere modo ac catena, ea invicem connectuntur. Hinc, omnia e causa aliqua generali originem ducere, haud absimile est. Statum videretur illo diversum, e quo prognosis infelix deducitur, faustum fore. Haec tamen ratio licet maxime congruens, experientia non semper firmatur : namque eos interdum invenimus unum pedem in cymba Charontis pro certo tempore habentes, alterumque brevi, ut videretur, secuturum, subito e faucibus lethi correptos, et fere uno eodemque vestigio temporis quo mors timenda fuit, cibum poscentes. Hujusmodi exempla duo e praxi medica cel. GREGORY se offerunt ; ex quibus constat, primum aegrotum pulmonaria ingurgitasse ; alterum sermonem cum aliquo habuisse de rebus politicis, in ipso temporis articulo quo hic medicus mortuos supposuerat. E contra,

alios

alios interdum conspicimus cum omni spe convalescentes, extemplo morte correptos. Hujusmodi exemplum narrat idem medicus : dum signa discipulis propitia praedicaret, aegrotus cum matre sermonem habens, mortis angoribus subito arreptus fuit.

*Fluidorum putredo.*—Petechias, maculas et vibices, haemorrhagias, gangraenam, halitum foetidum quod attinet, ratione potius ad statum solidorum laxum et enervatum habita, quam ad conditionem fluidorum putridam, tam prope cum *pathologia humoralis* connexam, clarius et liquidius, nostro judicio, hae redduntur ; quia nisi per statum solidorum minus firmum exoriri nequeunt ; verum enimvero, si in concessio esset, haec signa postquam apparuerint, putrida evenire, non ullo quidem modo sequitur, massae totius fluida tunc per corpus celeriter rapta, in statu putrido esse. Petechiae vero aliaeque eruptiones febriles nonnunquam absorbentur, quum si putredine imbutae,



imbutae, minime corpori humano sanae forent,  
ut mox planum reddere conabimur.

Sententia cel. MUNRO suis in praelectionibus  
de epistaxi in typho prolata, nostram opinionem  
magna ex parte confirmat ;—Epistaxin scilicet,  
ex atonia solidorum et tenuitate fluidorum reve-  
ra proficisci.

Rem ad plenum perscrutari non liquet nobis  
per otium limitesque hujus opusculi. Facta id-  
circo perpauca tantummodo proponemus, ad  
rem potissimum spectantia.—In *scorbuto* fluida  
putrida esse, plerique putant : tamen certiores  
facti sumus ab experimento à LIND instituto,  
fanguinem scorbuticorum in eodem aëris statu  
servatum, non citius corruptum fuisse quam eum  
ex venis sanorum detractum. In alio experi-  
mento, ofellas ovinas sero scorbutico immerfit ;  
alias sero salubri. Illae non vitatae sunt, sed

suave et jucundè oluerunt quamdiu posteriores, quae sanguine puro maceratae fuerunt.

LETTSON in re medica sagax narrat, se, multas mulieres febre carcerum laborantes, visisse, quae lac per totum morbi decursum infantibus praebuerunt: febrim tamen prorsus effugerunt\*.

Multa sunt experimenta quae nostro proposito inservire videntur. Ex thesi inaugurali Doc. EVANS constat, se cum Doctore MEADE ipsum adjuvante, in venam jugularem canis, sanguinis recentis drachmas duas infudisse, quae ex altero cani detractae sunt. Conglutinavit vulnuscum et sanus abiit. Ex aliis experimentis patet, cum leviter vitiatus vel penitus corruptus fuisset sanguis, canis confestim graviter aegrotare coepit, et quasi ebrius ambulavit. Vomitus, dyspnoea,

\* LETTSON'S *Memoirs of the London Dispensary*, p. 26.



noea, languor universalis supervenerunt, convulsionibus dein succedentibus, vita excessit.

Per haec experimenta verisimillimum videtur, si *putridus* eveniret sanguis, incongruens et minime flammae vitali commodus esset. His praetermissis, LIND, experimento alio, omne dubium exemit. Namque, fero sanguinis centum scorbuticorum gustato, insipidum ac albumen ovi id reperit.

Status putrefactus scorbuticus, nostro saltem iudicio, ad typhum ingravescentem referri potest; quia signa eadem putrida, ut vocantur, in conspectum produnt, scilicet, petechiae multiformes, foetor halitus, haemorrhagiae, diathesis gangraenosa, &c. Exinde concludere liquet, haec signa typhi ex alia, praeter hanc ratam, dependere causa; quippe quod morbus, ne alia proferam argumenta, sine contagio interdum saevit.

faevit. Ne hoc in dubio sit, quaeramus quo in modo originem duxerat ?

*Ratio medendi.*—Multa remedia ad sanationem hujus morbi dicata, de quibus haud pauci jam pridem fusè tractaverunt, jam recensere supervacuum duco. Ad principia igitur et quae frequentius usitata me accingam ; sed imprimis ad *consilia medendi*, quae *tria* nobis videntur.

*Primum.*—Causas occasionales quam citissime dimovere ;

*Dein.*—Diatthesin phlogisticam subigere ;

*Demum.*—Debilitati occurrere.

Haec consilia post remedium *vomitorium* sub morbi initium exhibendum, accommodata videntur. Effectus ejus, ob sympathiam universalem, in totum corpus pervadunt. Nonnullis creditur, effec-



tus optabiles e concussione vehementi subitaque exoriri, systemate nervoso, contagione affecto, mutationem, eam ob causam, subiente. Rem ita sese habere, non obito; minime vero negandum est, quin modus operationis secundarius utilis esset; nempe, ut ventriculum e contentis morbidis conflatum, propter ejus debilitatem fibrarum, exoneret et sudorem postea eliciat.

*Consilium primum* — Hoc, sordes amovendo cubiculumque ventilando, potissimum absolvitur, Cum id facile non fieri potest, aër densus foedusque ignibus seu vaporibus *aceti* vel *olei essentialis resinae terebinthinae*, &c. purgandus.

*Consilium secundum.* — In hoc morbi stadio *remedia diaphoretica* saepe levamen afferunt, praesertim ad febris insultum; nam tunc, testante PRINGLE, magno cum fructu exhibentur; si tamen magna urgerit debilitas, minus utilia fiunt. *Alyus* per omnia morbi stadia solvenda sit, praecipue

cipue cum impetus vehemens sanguinis ad caput irruit. In *priore* statu, *enemata emollientia* uti corpus parum debilitant, optimos edunt effectus. In *posterore*, cathartica mitiora, qualia sunt *oleum ricini*, vel quidam e salibus neutris, vel etiam *antimonium tartarizatum* parvis dosibus saepe iteratis, exiguntur. Mutanda quoque sunt lintea et corporis et lecti; et summa mundities observanda est. Oportet etiam fortasse quod corpus indies, aquâ frigidâ cum aceto mistâ, lavandum sit.

Jam luculenter patet, *aquam frigidam* in morbo de quo hic agitur, effectus peroptabiles plerumque edere. Si nobis theoriam proponere fas sit, ratio agendi sic quodammodo explicari queat.—Pulsus debiles, crebri, debilitatem atque irritabilitatem cordis arteriarumque pro causa agnoscunt. Haecce conditio autem arteriarum maximam partem propter calorem ardentem perdurat, qui corpus sanè multum infirmit. Cor,  
calore



calore imminuto, fluxum sanguinis majorem excipit, unde sanguis aucta vi propulsus est, et ictus arteriarum pleniores tardioresque eveniunt. Haud abfimile videtur etiam, delirium, tinnitus aurium, aliasque cerebri affectiones quae ex statu quodam inflammatorio exoriri videntur, sic multum allevari. Haud incongruum est quoque, quin *vinum, opium, cortexque cinchonae* effectus eisdem praestant, cum hoc autem discrimine, quod haec remedia systema nervosum et cor roborando *directè* agunt; dum *indirectè* agit lavatio frigida.

*Consilium tertium* — Hoc consilium enimvero quod attinet, medicamenta efficacissima sunt quae corpus roborant et incitant; qualia *cortex Angusturae, pulvis Swictanae, radix Colombae, cortexque Cinchonae*. Incitantia sunt *vinum, alkali volatile, moschus, camphora, vesicatoria et opium*. Quae praecipuè usurpantur, sunt *vinum, moschus, vesicatoria, opium, cortex Cinchonae*.

*Cortex Angusturae.*—Hoc medicamentum ut amarum et aromaticum, ad fibras ventriculi roborandum multum pollet. Cel. DUNCAN effectus praestantissimos in statu debili, multis in casibus, compertus est. Ex quibusdam etiam observationibus constat, cel. viatorem BRUCE doses hujus medicaminis in se ipsum, felici cum successu, exploravisse.

*Vinum.*—Huic morbo optimè respondit vinum, utpote stimulus et amicus et cardiacus; immo equidem, omnibus aliis medicamentis ad vires restaurandas planè antecellit.

*Moschus.*—In signis admodum periculosis, scilicet in singultu subsultuque tendinum quae versus finem ingruunt, saepe valet moschus. Medicus ingeniosus CLARK effectus ejus sic ornatè descripsit. “ *Musk given to the quantity of a*  
 “ *scruple every four hours, seldom failed to abate*  
 “ *the hiccup, and other convulsive symptoms atten-*  
 “ *dant*



“ dant on fever, and to act as a powerful cordial  
 “ and diaphoretic \*.”

*Vesicatoria.*—Haec pene semper in usu sint, si dolor typi inflammatorii in qualibet parte urgeat ; caeteroquin multo minus utilia, ut verbis frequentibus concinnè et pulchrè ostendit cel. Professor GREGORY. “ *Existimata sunt praesertim*  
 “ *respondere sub finem februm, et in iis casibus ubi*  
 “ *magna infirmitas, et stupor vel sopor aliquis ade-*  
 “ *rant. Talis autem sopor non semper nocet, aut*  
 “ *hujusmodi remediis eget ; et viribus multum frac-*  
 “ *tis, motuque imprimis sanguinis deficiente, non de-*  
 “ *sunt alia, promptiora, et efficaciora, et magis*  
 “ *grata, et magis tuta, remedia stimulantia, exter-*  
 “ *na pariter et interna †.*”

Hoc opusculo ad finem pene usque perducto,

E

supereſt

\* CLARK on Hot Climates, p. 142.

† *Conſpect. Med. Theoret.* p. 489. Vol. II.

superest ut pauca de effectibus *opii* inspicienda proponamus.

*Opium*.—Odor huic ingratus, saporque fastidiosus et amarus, tum et ex experimento cum solutione aquae chalybeatae, videtur astringens. Dosis modica tranquillitatem animi amicissimam gignit, languore torporeque excipiendam. Ictus arteriarum primum crebriores, dein molliores, pleniores et tardiores eveniunt. Si calor sit vehemens, uti in stadio calido febris intermittens, ad eum gradum quem Dr ALEXANDER argutè probavit ad sudorem eliciendum minus idoneum, dosis sat magna hujus medicaminis motum sanguinis insolitum, celeremque, qui hunc calorem induxerat, mitigat: sic pulsibus momentum praebet, et, testante LIND, sudorem e corporis superficie, hoc in statu, elicit.

Dosis major *opii* perturbationem capitis cum vertigine efficit. Ad dosin adhuc ampliorem  
 auctum,



auctum, non solum vertiginem et cephalalgiam, sed tremores etiam cum delirio convulsionibusque producit. Tandem, haec signa in stuporem quam maxime profundum evanescent. Stertor sequitur; denique mors.

Multum laudatur in morbo nobis perpenso, quippe quod in tremoribus, delirio, subsultibus tendinum, vigilantia, diarrhoea, &c. pollet.

Ex his quae sequuntur factis, quibusdam *incitare* videtur opium.

Signa furiosa infani cujusdam, ope sanguinis detracti remediorumque cathartorum, sedata fuerunt. Magna vis opii ad somnum profundius conciliandum adhibita fuit. Haud ita multo post redierunt signa priora; immo equidem aucta vi.

Infanti undecim menses natae, quae cholera  
morbo

morbo cum signis universè inflammatoriis propter dentitionem laboravit, portiunculam opii dedi. Symptomata aliquantisper post exhibitionem graviora evaserunt.

Portiuncula opii, quam sequitur ne vix quidem ullus collapsus, ut vocatur, somnum adimit aequè ac vinum, vel alius stimulus ut saepe expertus sum. Fertur quoque, illos qui parum aegrotant et somno se dare cupiunt, opium semper capere, aliquot horas inter lectum se recipiendum. Effectus ejus primarii in Turcos, qui hoc inter pugnandum devorant, haud sedativi, ut quidam asserunt, sed quam maxime incitantes, uti nobis apparet ex animi constantia, audentia, viribusque corporum eorum adauctis; namque simili fere modo pugnant ac Hiberni potu semigraves.

Hemicrania cum diarrhoea laboravi, quibus L. L. guttas triginta noctu sumpsi. Calor ardens;  
pulsus



pulsus duri, crebri plenique; dolor summi capitis crucians evenerunt. Totam noctem insomnis peregi, et sudor, ad mane usque interceptus fuit. In disquisitione inaugurali Dr FOWLER de *Inflammatione* prolata, hoc medicamentum, inter quosdam stimulos multum celebratur. Ex suis experimentis in arterias cuniculorum per opium institutis, narrat quod “gravis statim inflammatio excitabatur, quae tamen brevi subsidebat\*.” Non defunt alia pernumerosa quidem hujusmodi experimenta.— Ex omnibus his factis, nobis, inferre haud absolum esset, primarium *opii* effectum ad vim muscularem, et signa inflammatoria magis adhuc incitandum, esse. Verum enimvero, quamprimum vis ejus prima confidet, *collapsus partialis*, si arteria vel musculus afficientur; *universalis*, si ventriculus, ratione ad dosin satis amplam habita, sequitur, qui perpetuo est sequela cujuslibet stimuli. Per hoc posterius stadium, signa inflammatoria subsident,

\* *Tentamen Medicum Inaugurale de Inflammatione*, p. 21.

subfident, vel ut brevi expediamus, cum irritabilitas partis affectae magnopere imminuta est.

Quamvis *incitatio* et *collapsus* ex magna dosi medicamenti stimulantis nunquam non exoriuntur; tamen *collapsus* jure attribuitur, magna saltem ex parte, naturae fibrae muscularis; namque intellectu difficile est, quo in modo una singula res effectus binos adversarios, in se ipsa habere potest. Hoc, ut opinor, significaret “*rem posse esse, ac eandem esse tamen nequire.*” Cum ullus stimulus agere cessat, effectus primarius iterum pro certo tempore incitatus est, idem remedium aucta dosi exhibendo, alterumve in ejus loco; quod saepenumero in me ipso expertus sum. Verum cum stimulus diu adhibeatur, pars affecta adeo fit exhausta, quod nullus omnino effectus in conspectum prodit; quia enim pars gradatim minus irritabilis, et sensus expers evadit. Nonne hinc, praeter rationem supra recensitam, probabile, quod stimulus, dum in qualibet parte, agat, aliquid e nervis et fibris muscularibus



laribus eripit, unde debilitas sequens? Ebrius idem non est, qui paulo ante fuit; nec idem est quidem proximo die cum hebitudo et torpor, non solum totius corporis, sed animi quoque superveniunt. Quo major fit irritabilitas, eò citius ebriositas. Infantes et impuberes citius inebriati, adulti et praecipue phlegmatici tardiùs.

F I N I S.











